

Trivagin[®]

ŻEL

do stosowania pomocniczo
w leczeniu infekcji okolic intymnych

SPIS TREŚCI

1. Co to jest Trivagin Żel i w jakim celu się go stosuje?
2. Skład.
3. Informacje ważne przed użyciem Trivagin Żel.
4. Jak stosować Trivagin Żel?
5. Możliwe działania niepożądane.
6. Jak przechowywać Trivagin Żel?
7. Inne informacje.

CO TO JEST TRIVAGIN ŻEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Trivagin Żel do stosowania pomocniczo w leczeniu infekcji okolic intymnych łagodzi objawy infekcji grzybiczych i bakteryjnych, takie jak: świąd, pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienia towarzyszące upławom.

Nawilża i przywraca naturalną barierę ochronną okolic intymnych, dzięki czemu chroni je przed rozwojem flory patogennej.

Utrzymuje właściwe pH odpowiedzialne za tworzenie bariery ochronnej skóry i wspomaga odbudowę naturalnej flory bakteryjnej sromu i krocza. Eliminuje suchość skóry i błon śluzowych.

Trivagin Żel jest łatwy w użyciu. Nie brudzi bielizny i nie pozostawia uczucia lepkości.

Wyrób medyczny może być stosowany wspomagająco w przebiegu:

- leczenia zapalenia sromu różnego pochodzenia, w tym grzybiczego i bakteryjnego,
- cukrzycy i chorób wyniszczających, sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych,
- porodu i menopauzy,
- antybiotykoterapii,
- antykoncepcji,
- uczulenia na środki piorące, bieliznę czy dezodoranty,
- wtórnego zapalenia sromu spowodowanego przesadną higieną,
- jak również profilaktycznie, w sytuacjach utrudnionej higieny: przed i po korzystaniu z basenu, sauny, solarium, w podróży.

SKŁAD

Woda, oksyetylenowany alkohol laurylowy, glicerol, fenoksyetanol, kopolimer kwasu akrylowego i alkilometakrylanu, alfa-glukan, trójetanoloamina, dioctan glutaminianu tetrasodowego, etyloheksylogliceryna, polisacharydy, hialuronian sodu, kwas mlekowy.

INFORMACJE WAŻNE PRZED UŻYCIEM TRIVAGIN ŻEL

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosuj na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
- Nie stosuj w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwij stosowanie preparatu i skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku ciężkich zapaleń sromu i krocza skontaktuj się z lekarzem przed użyciem wyrobu.
- Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosuj po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.
- Nigdy nie dotykaj końcówką dozownika tubki do skóry lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić żelu.
- Unikaj kontaktu z oczami.
- Nie stosuj dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany żel wyrzuć.

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i pićiem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na skuteczność wyrobu.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży i karmienia piersią wyrób stosuj po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie wyrobu nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.

Stosowanie z innymi lekami/ wyrobami medycznymi

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami/ wyrobami medycznymi, jednak po aplikacji wyrobu nie stosuj żadnych innych leków/ wyrobów medycznych/ płynów w obrębie okolic intymnych przez 30 minut.

JAK STOSOWAĆ TRIVAGIN ŻEL?

Przed zastosowaniem żelu, dokładnie umyj i osusz okolice intymne. Rozprowadź cienką warstwę żelu na skórę zewnętrznym narządów płciowych w kierunku od przodu do odbytu. Stosuj w zależności od potrzeb, 2-3 razy dziennie. Przed i po użyciu żelu dokładnie umyj ręce. Żel nie brudzi bielizny. Wyrób przeznaczony dla kobiet i dzieci powyżej 3 roku życia.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Wyrób medyczny Trivagin Żel jest dobrze tolerowany i brak jest danych o działaniach niepożądanych po jego zastosowaniu.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny Trivagin Żel należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

JAK PRZECHOWYWAĆ TRIVAGIN ŻEL?

Wyrób medyczny Trivagin Żel przechowuj:

- w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C,
- nie zamrażaj i nie przechowuj wyrobu w lodówce,
- z dala od promieni słonecznych,
- w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po użyciu opakowanie zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

INNE INFORMACJE

Trivagin Żel jest wyrobem medycznym klasy I.

Opakowanie

Tubka o objętości 30 ml w kartoniku jednostkowym.

 Verco S.A.
ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa



Objaśnienia użytych symboli



zajrzyj do instrukcji używania



użyć przed końcem



wytwórca



numer serii



ostrzeżenie



nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



znak zgodności CE



ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania



chronić przed słońcem

Data aktualizacji instrukcji używania: 11.2015