

Instrukcja używania

 SutriHeal^{Forte}
5%

Maść do gojenia ran

Do gojenia wszelkich skaleczeń, otarć, pęknięć, oparzeń i owrzodzeń skóry u ludzi

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej ulotki przed zastosowaniem produktu.

Maść do stosowania zewnętrznego, do miejscowego leczenia.

Spis treści niniejszej ulotki:

- Co to jest maść SutriHeal Forte 5% i w jakim celu się ją stosuje
- Instrukcja użycia maści SutriHeal Forte 5%
- Składnik aktywny
- Wykaz składników
- Warunki przechowywania i okres trwałości
- Możliwe działania niepożądane
- Dalsze informacje

Co to jest maść SutriHeal Forte 5% i w jakim celu się ją stosuje:

Skuteczność maści SutriHeal Forte 5% opiera się na biologicznym działaniu związków znajdujących się w żywicy świerku norweskiego (*Picea abies*). Maść SutriHeal Forte 5% stosuje się do miejscowego leczenia zakażonych i niezakażonych ran w warunkach domowych lub ambulatoryjnych. Rany mogą być ostre lub przewlekłe: jak np. otarcia, pęknięcia, uszkodzenia skóry, rany oparzeniowe lub rany powstałe na skutek otwarcia pęcherzy. Naturalna żywica w maści SutriHeal Forte 5% jest rafinowana w opatentowanym procesie oczyszczania zaprojektowanym przez Repolar Pharmaceuticals Oy.

Instrukcja użycia maści SutriHeal Forte 5%:

Otarcie, pęknięcie skóry lub rana powinny zostać oczyszczone wodą i osuszone. Maść SutriHeal Forte 5% należy nakładać bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie. W razie potrzeby zabezpieczyć bandażem lub gazą przepuszczającą powietrze. Przetoki i rany powstałe na skutek pęknięcia pęcherzy należy leczyć zgodnie z zaleceniami pielęgniarki lub lekarza. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Składnik aktywny:

Rafinowana naturalna żywica świerku norweskiego (*Picea abies*).

Wykaz składników:

Makrogol 400, Makrogol 3350, rafinowana żywica świerku norweskiego (*Picea abies*), glicerol, alkohol denaturowany.

Warunki przechowywania i okres trwałości:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 30°C. Produkt po otwarciu jest stabilny przez rok. Termin ważności podany jest na pudełku i tubce. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



12 M

– po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy

Ciąża lub karmienie piersią:

Brak informacji na temat możliwych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje:

Nie są znane żadne klinicznie istotne interakcje.

Prowadzenie pojazdów:

Stosowanie produktu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zaburzenia czynności nerek:

Makrogol (glikol polietylenowy) może być wchłaniany poprzez uszkodzoną skórę lub ranę, a następnie wydalany przez nerki. Podobnie jak w przypadku innych maści na bazie glikolu polietylenowego, maści SutriHeal Forte 5% nie należy stosować w warunkach, w których możliwe jest wchłanianie dużych ilości glikolu polietylenowego, zwłaszcza u pacjentów z rozpoznaną umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Zdarzenia niepożądane:

Możliwe działania niepożądane obejmują reakcję alergiczną na składniki żywyce. Objawem reakcji alergicznej jest miejscowe podrażnienie skóry na leczonym obszarze (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry). Szacuje się, że około 1-3% populacji ma alergię na żywicę. Jeśli w trakcie leczenia pojawią się objawy alergii należy natychmiast przerwać stosowanie maści. Należy powiadomić wytwórcę o wszelkich możliwych zdarzeniach niepożądanych, interakcjach itp.

Jeśli znana jest nadwrażliwość na żywicę, należy przetestować maść SutriHeal Forte 5% na niewielkim obszarze skóry. Jeśli objawy alergiczne (swędzenie, rumień, obrzęk, pęcherze itp.) wystąpią w ciągu 3 dni, nie można stosować maści SutriHeal Forte 5%. Jeśli objawy alergiczne wystąpią później, podczas leczenia, należy natychmiast przerwać stosowanie maści SutriHeal Forte 5% i zastosować inne leczenie. W nagłych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej wersji instrukcji użycia: 05/2018

Wytwórca:



HELP SA

10 Valaoritou St.
14452 Metamorphosis Attica,
Greece
T: +30 210 281 5353
F: + 30 210 281 1850

Fabryka:

Pendini Ioannina
45 500 Ioannina, Greece
info@help.com.gr
www.help.com.gr

Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

Produkt na licencji
REPOLAR PHARMACEUTICAL OY

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

CE 0653

SH515/1/010319 702575-1