

CATAROFT Free

krople do oczu, bez konserwantów

1. Co to jest CATAROFT Free i w jakim celu się go stosuje

CATAROFT Free to nawilżający, izotoniczny roztwór do oczu, który zawiera dodatkowo jodek potasu. Jest przeznaczony do zakraplania oczu. Dodany jodek potasu działa w oku jako substancja wychwytyjąca wolne rodniki. Te właściwości jodku potasu wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu wspomagającym wysięków (nagromadzonego płynu tkankowego) i krwotoków w oku.

Bez konsultacji z okulistą preparat można stosować do zwykłego nawilżania oka – w tym celu należy wkropić go do oka lub zrobić okład na powiekę. Produkt może być również pomocniczo stosowany do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania (w szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii).

CATAROFT Free jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

CATAROFT Free nie zawiera środków konserwujących, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób z wrażliwymi oczami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem produktu CATAROFT Free

Nie używać kropli CATAROFT Free w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, patrz punkt 6).

Kropli do oczu CATAROFT Free nie należy również stosować w następujących przypadkach:

- ciąży lub karmienie piersią,
- przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy,
- skaza krwotoczna,
- u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy,
- u noworodków.

W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych na ogół zaleca się, aby zachować odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy aplikacją każdego z preparatów.

3. Sposób stosowania produktu CATAROFT Free


Dokładne dawkowanie i okres stosowania produktu ustala lekarz. Zazwyczaj stosuje się 1–2 krople do worka spojówkowego do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie.

Osoby noszące soczewki kontaktowe


Osoby stosujące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć przed zastosowaniem produktu CATAROFT Free. Po zakropleniu produktu CATAROFT Free należy odczekać 20 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Sposób użycia

1. Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję.
2. Odkręcić nakrętkę z butelki.




3. Trzymać butelkę do góry dnem pomiędzy kciukiem a innymi palcami.
4. Przed pierwszym użyciem zaleca się wyciśnięcie pierwszej kropli poza okiem, delikatnie uciskając butelkę, ponieważ silne i nieregularne uciskanie butelki może prowadzić do wypchnięcia większej objętości roztworu.
5. Za pomocą palca delikatnie odciągnąć dolną powiekę ku dołowi.




6. Umieścić końcówkę zakraplacza w pobliżu oka, jednak w taki sposób, aby nie dotykała oka ani jego okolic.

7. Ucisnąć delikatnie butelkę w taki sposób, aby do oka została zakroplona tylko jedna kropla. Następnie zwolnić dolną powiekę i powoli zamknąć oko, tak aby CATAROFT Free został równomiernie rozprowadzony po powierzchni oka.



Należy zauważyć, że może być kilka sekund opóźnienia pomiędzy uciśnięciem butelki a wydostaniem się z niej kropli. Butelki nie należy ścisnąć zbyt mocno.

8. W razie potrzeby powtórzyć całą procedurę w celu zakroplenia produktu do drugiego oka.



9. Po użyciu należy każdorazowo wstrząsnąć butelką, kierując ją w dół, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu z końcówki zakraplacza, jednak nie dotykając jej. Jest to konieczne do zapewnienia jałowości kropli do oczu i łatwiejszego podania kolejnej kropli podczas następnej aplikacji produktu.

10. Natychmiast po podaniu produktu dokładnie zamknąć butelkę.

4. Możliwe działania niepożądane

CATAROFT Free jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowany. Bezpośrednio po zakropleniu może wystąpić chwilowe, lekkie pieczenie lub szczypanie.

Bezpośrednio po aplikacji produktu przez bardzo krótki czas możliwe jest niewyraźne widzenie, które może utrudnić prowadzenie samochodu i obsługę maszyn. Z tego względu zaleca się, aby nie wykonywać tych czynności przed upływem 15 minut po aplikacji produktu.

Niekontrolowane i długotrwałe podawanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. „jodyzmu”: podrażnienia i przekrwienia spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powiek (obrzęk Quinckego) i gruczołu łzowego. Mogą również wystąpić objawy skórne: zaczerwienienie, trądzik, zapalenie skóry i plamica.

W razie wystąpienia wyżej opisanych działań niepożądanych lub innych nietypowych reakcji należy o nich poinformować lekarza prowadzącego.

5. Co zawiera CATAROFT Free

Chlorek sodu 2 mg na 1 ml, jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, wodorotlenek sodu, woda wysokooczyszczona.

6. Jak przechowywać CATAROFT Free i inne informacje

Przechowywać butelkę w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.


Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać preparatu po upływie daty ważności podanej na etykiecie butelki lub na kartoniku obok symbolu klepsydry. Data ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie używać produktu CATAROFT Free po upływie 12 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Po zakropleniu produktu CATAROFT Free natychmiast szczelnie zamknąć butelkę.

Wielkość opakowania: 1 × 10 ml

 UNIMED PHARMA spol. s r.o.,
Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 2 4333 3786, fax: +421 2 4363 8743
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

 2265

STERILE A

Dystrybutor w Polsce:

Verco S.A., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa

Ta instrukcja używania została zaktualizowana po raz ostatni w marcu 2021 r.

CATAPF10//010321